



預防麻疹 不麻煩



全球麻疹疫情延燒，
臺灣也出現感染案例

麻疹特性

高傳染力

多重傳染途徑
(空氣、飛沫及接觸傳染)

有潛伏期
(平均為14天)

麻疹主要症狀

發燒



鼻炎



紅疹



結膜炎



咳嗽



如何預防？

-  按時接種疫苗
-  避免出入空氣不良之密閉空間、勤洗手、戴口罩
-  避免帶未具抗體幼兒前往流行國家



การป้องกันโรคหัด ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก



การแพร่ระบาดของโรคหัดกำลังลุกลามทั่วโลก
ได้วันก็เริ่มพบผู้ติดเชื้อเช่นกัน

ลักษณะของโรคหัด

ติดต่อได้ง่ายและแพร่เชื้อ
รวดเร็ว

ติดต่อได้หลายทาง

(ทางอากาศ ทางสัมผัสละออง
น้ำลาย น้ำมูก)

มีระยะฟักตัว

(ประมาณ 14 วัน)

อาการสำคัญของโรคหัด

มีไข้



จาม ไอ แสบ



ผื่นแดง



ตาแดง



ไอ



จะป้องกันได้อย่างไร?



ไปฉีดวัคซีนให้ตรงเวลา



หลีกเลี่ยงการเข้า-ออกจากพื้นที่อับอากาศและการระบายอากาศไม่ดี

ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย



หลีกเลี่ยงพาเด็กเล็กที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรค

เอเย่นต์แพน ห่วงใยคุณ



Preventing measles is not a hassle



Measles is spreading around the world and there have been cases in Taiwan.

Measles characteristics

Highly contagious

Multiple routes of infection
(can be transmitted by air, droplets and contact)

Average incubation period of 14 days

Main symptoms of Measles

Fever



Rhinitis



Rash



Conjunctivitis



Cough



How to prevent this disease?




Get vaccinated on time.



Avoid going in and out at a crowded places with poor ventilation, wash your hands frequently, and wear a mask.



Avoid traveling to endemic countries with young children who do not have antibodies yet.



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告

Pan-Asia Manpower cares for you



Phòng ngừa bệnh **sởi** không phải là **một vấn đề rắc rối**



Sởi đang lây lan trên toàn cầu,
ca nhiễm cũng đã xuất hiện tại Đài Loan

Đặc tính của bệnh sởi

Lây lan mạnh

**Lây nhiễm qua
nhiều đường**
(không khí, nước
bọt và tiếp xúc)

**Có thời gian ủ
bệnh**
(trung bình 14 ngày)

Các triệu chứng của bệnh sởi

Sốt



Viêm mũi



Phát ban đỏ



Viêm kết mạc



Ho



Làm thế nào để phòng ngừa?



Tiêm vắc-xin đúng lịch.



**Tránh ra vào những nơi có không gian kín, thông gió kém,
rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang.**



**Tránh đưa trẻ em chưa có kháng thể đến các quốc gia có
dịch.**



Mencegah penyakit campak tidak sulit



Penyakit campak global menyebar luas, juga muncul kasus terinfeksi di Taiwan

Sifat Campak

Daya penularan kuat

Berbagai ragam saluran penularan
(penularan melalui udara, droplet dan kontak langsung)

Ada masa inkubasi
(rata-rata 14 hari)

Gejala utama campak

Demam panas



Rhinitis



Ruam



Konjungtivitis



Batuk



Bagaimana mencegah?



Tepat waktu suntik vaksin



Menghindari keluar masuk ruangan sirkulasi udara yang kurang baik dan ruangan kedap udara, rajin cuci tangan, dan pakai masker



Menghindari membawa anak kecil yang tidak memiliki antibodi menuju negara endemis