

感染性腸胃炎2大類型一次看懂!

全年常見

病毒性腸胃炎



潛伏1-3天，持續2-3天，會嘔吐、發燒及肌肉痠痛



多休息、多喝水和補電解質最重要

夏天高發

細菌性腸胃炎



潛伏半天到5天，可能拉血便或膿便，
病程7-10天較嚴重



建議立即就醫，必要時需使用抗生素



康復小訣竅

腸胃炎雖常見，若是嚴重
情況還是要立即就醫!



喝稀釋運動飲料補水分，忌油、忌辣、忌奶、忌甜食



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告

亞太人力/亞太國際
關心您

รู้จักโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ!

พบได้ตลอดทั้งปี

โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบจาก**ไวรัส**



มีระยะฟักตัว 1-3 วัน อาการจะคงอยู่นาน 2-3 วัน จะมีอาการอาเจียน มีไข้ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ



การพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ และเครื่องดื่มเกลือแร่ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ระบาดสูงในฤดูร้อน

โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบจาก**แบคทีเรีย**



มีระยะฟักตัวตั้งแต่ครึ่งวันถึง 5 วัน อาจมีอาการถ่ายเป็นมูกเลือดหรือหนอง โรคมักมีความรุนแรงและใช้เวลาฟื้นตัวนาน 7-10 วัน



แนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ



เคล็ดลับ การดูแลตัวเองเมื่อป่วย

แม้ว่าโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบจะพบได้บ่อย แต่หากมีอาการรุนแรง ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว



ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่หรือเครื่องดื่มกีฬาในสัดส่วนที่เจือจางเพื่อทดแทนน้ำ หลีกเลี่ยงอาหารมัน อาหารรสจัด ผลิตภัณฑ์นม และขนมหวานระหว่างฟื้นตัว



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告

ทรัพยากรบุคคลเอเชียแปซิฟิกและเอเชียแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนล
ห่วงใยคุณ

Understanding the two types of infectious gastroenteritis

Year-round

Viral gastroenteritis



Incubation period: 1-3 days, symptoms last 2-3 days and include vomiting, fever and muscle aches



It is important to rest, stay hydrated and replenish electrolytes

more common in summer

Bacterial gastroenteritis



Incubation period: half a day to 5 days and causes bloody or pus-filled stool; illness can last 7-10 days and be more severe



Seek immediate medical attention and, if necessary, take antibiotics



Recovery tips

Even though gastroenteritis is common, in the event of severe symptoms seek immediate medical attention



Drink diluted sports drinks to remain hydrated, avoid oily, spicy, dairy, and sugary foods



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告

Pan-Asia Manpower/ Pan-Asia International
Cares for you

Hiểu rõ 2 loại viêm dạ dày ruột truyền nhiễm phổ biến

Xuất hiện quanh năm

Viêm dạ dày ruột **do virus**



Thời gian ủ bệnh 1–3 ngày, kéo dài 2–3 ngày, có triệu chứng nôn mửa, sốt, đau nhức cơ.



Quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi nhiều, uống đủ nước và bổ sung chất điện giải.

Bùng phát cao vào mùa hè

Viêm dạ dày ruột **do vi khuẩn**



Thời gian ủ bệnh từ nửa ngày đến 5 ngày, có thể bị tiêu chảy ra máu hoặc mủ, bệnh kéo dài 7–10 ngày, mức độ nghiêm trọng hơn.



Khuyến nghị nên đi khám ngay, nếu cần thiết phải dùng kháng sinh.




Mẹo nhỏ giúp phục hồi

Dù viêm dạ dày ruột là bệnh phổ biến, nhưng nếu tình trạng nghiêm trọng thì phải đi khám ngay!



Uống nước uống thể thao đã pha loãng để bổ sung nước, tránh đồ chiên dầu, cay, sữa và đồ ngọt.



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告

CÔNG TY MÔI GIỚI Á THÁI/ CÔNG TY QUỐC TẾ Á THÁI
Quan tâm bạn!

Sekaligus Memahami 2 Jenis Utama Gastroenteritis Menular!

Sepanjang tahun

gastroenteritis **diakibatkan virus**



Masa inkubasi 1 – 3 hari, berlanjut 2 – 3 hari, bisa muntah, demam dan nyeri otot



Yang terpenting adalah perbanyak istirahat, minum air dan asupan elektrolit.

Sering terjadi di musim panas

gastroenteritis **diakibatkan bakteri**



Masa inkubasi dari setengah hari hingga 5 hari, mungkin feses berdarah atau bernanah, penyakit menjadi lebih serius setelah 7 – 10 hari



Disarankan untuk segera mencari pertolongan medis, dan jika diperlukan maka harus menggunakan antibiotik




Tips Pemulihan

Meskipun gastroenteritis sering terjadi, tetapi apabila situasi serius maka harus segera mencari pertolongan medis!



Minum minuman olahraga yang diencerkan untuk mengisi kebutuhan air, dilarang makan makanan berminyak, pedas, susu dan makanan manis



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告

**Pan-asia International/ Man-power
Peduli Anda**